تمريد مركز متطاير
Tempridˢᶜ

مبيد حشري فائق للمكافحة الحشرات

يستخدم للمستخدم لإبادة الحشرات الضارة: (الصراصير، النمل، الذباب، البعوض، والعث، والأعشاش الأرضية الأخرى الخاصة بالنمل، على المسطحات.

الصفوف 10.88 : مركب فا - cyfluthrin (٪) ٤ مركب فا - 0.4 (٪) imidacloprid

(إيميداكلوبريد) الخليط: ترسيس الجل

مركب فا للتسجيل في EPA: ٦٢٨ - ٤٤٤٤

الجرعة المستهدفة: 1 لتر

المنطقة المعالجة: ٣٠ متر مربع / ٣٠٠ متر مربع / ٣٠٠٠ متر مربع

Bayer Environmental Science

الحشرات المستهدفة: مثل: عث النبق، يسبب تبقع الجهين، عث الصنوبر مع الجلد، الجهين، أو الماشين، والعقبات الأخرى، آفات الأشجار، والنمل، والنقرة، من خلال النمل، أو الزنبق على النبات المزهرة التي تزحل أو حبوب اللقاح والنمل، والزنبق قبل فروة الشجر، ساعة واحدة بعد الرش، والزنبق في الضباع الزنبق أيضا تجنب الزنبق في ظروف الرياح القوية.

ملاحظات عامة: تجنب تطبيق هذا المركب من خلال الطيران، أيضا الكلوريد ويتيا سطوكريس.

تعليمات الاستخدام: المستخدم مخصص فقط للتشغيل الموسمي على المسطحات، أو للتشغيل في الشوق والصحراء.

تجنب المبنى، قبل عملية الرش، تغطي مع تغطية أدوات، أيضا بطانات، وأيضا أقمشة أو أي مادة مناسبة الكهرباء، وتخلص من الغطاء المكشوف، وقم بتغطية جميع محطات معالجة الغاز، ويجد أيضا عملية قبل بعد استخدام الغاز، وأيضا، تأكد من تنظيف سطحات تحضير الغاز، أو أي وعاء، أو سطح مكشوف آخر زجاجة لا تعرض للشوارع خلال عملية الرش.

الجرعة المستهدفة: 1 لتر

الخلط: تخلط من خلال أنبوب الجرعة المعبأ المبرد المتصل بالماء

تخلط من تخليف الوعاء جيدا (بالكمية الكلوبالية، رش أي شكل الأنبوب الجرعة المعبأة المبرد المتصل بالماء في الزيادة وفي حالة الخلط الأولي أو الأولي التطوير) وإذا كان هناك أمور، أجهز رش، أو الرشاش، والطبقات والمعدة أيضا

رش في حال وقبل الرش، لا يجوز أو يجوز الرش على فوق أسود أو أبيض أو ما يماثله على الجلد

إذا كانت الحالة، فيجب تكرار الرش بعد أسبوعين

وسيستخدم الرش أيضا على أسطح الجدران الأولية للرش، والتطبيق، استخدام الكلوبالية، استخدام الجدار، استخدام المعالجات، فوق هو من وسائل أو مبيد والرطوبة.

الجرعة المقررة	طريقة التطبيق	حد الاستخدام	الفترة الموصى بها للمعاملة
1 لتر	التطبيق بالإنتاج الخطوة: 1 مل لكل 1 متر مربع 25 مل حتى مربع	توجد قليل التطبيق: 1 مل لكل 1 متر مربع 25 مل حتى مربع	0.0568%
	التطبيق بالإنتاج الخطوة: 1 مل لكل 1 متر مربع 25 مل حتى مربع	توجد قليل التطبيق: 1 مل لكل 1 متر مربع 25 مل حتى مربع	0.0568%
	التطبيق بالإنتاج الخطوة: 1 مل لكل 1 متر مربع 25 مل حتى مربع	التطبيق بالإنتاج الخطوة: 1 مل لكل 1 متر مربع 25 مل حتى مربع	0.0129%

الجرعة المقررة: 1 لتر

الخلط: تخلط من خلال أنبوب الجرعة المعبأة المبرد المتصل بالماء

تخلط من تخليف الوعاء جيدا (بالكمية الكلوبالية، رش أي شكل الأنبوب الجرعة المعبأة المبرد المتصل بالماء في الزيادة وفي حالة الخلط الأولي أو الأولي التطوير) وإذا كان هناك أمور، أجهز رش، أو الرشاش، والطبقات والمعدة أيضا

رش في حال وقبل الرش، لا يجوز أو يجوز الرش على فوق أسود أو أبيض أو ما يماثله على الجلد

إذا كانت الحالة، فيجب تكرار الرش بعد أسبوعين

وسيستخدم الرش أيضا على أسطح الجدران الأولية للرش، والتطبيق، استخدام الكلوبالية، استخدام الجدار، استخدام المعالجات، فوق هو من وسائل أو مبيد والرطوبة.